

Сарейп, КЭ

Наименование	Сарейп, КЭ	Группа	Инсектициды и акарициды
Препаративная форма	концентрат эмульсии	Действующее вещество	Абамектин
Содержание действующего вещества	18 г/л	Регистратор	РОТАМ ЛТД
Класс опасности	2/1	Срок окончания регистрации	09.10.2028
Номер государственной регистрации	102-01-2019-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Виноград (столовые сорта)	Паутинные клещи	0,75-1	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га	28 (2)	7(3)
Виноград (столовые сорта)	Виноградный войлочный клещ	1-1,5	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га	28 (2)	7(3)
Виноград (технические сорта)	Паутинные клещи	0,75-1	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га	60 (2)	7(3)
Виноград (технические сорта)	Виноградный войлочный клещ	1-1,5	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га	60 (2)	7(3)
Яблоня	Клещи	0,75-1	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1500 л/га	34(2)	7(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Яблоня	Яблонная медяница	0,75	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га	34(2)	7(3)

Аналоги

Вертимек, КЭ Биокилл, КЭ Крафт, ВЭ Мекар, МЭ Клеопатра, КЭ Шанситек, КЭ Мабет, КЭ

Альтернативы

Оберон Рапид, КС Стилет, МД Лирум, СК Аккар, Ж

