

Профилактик Био, ВЭ

Наименование	Профилактик Био, ВЭ	Группа	Инсектициды и акарициды
Препаративная форма	водная эмульсия	Действующее вещество	Вазелиновое масло + матрин
Содержание действующего вещества	658 + 2,2 г/л	Регистратор	АО Фирма "Август"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	17.06.2030
Номер государственной регистрации	021-01-2703-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Яблоня, груша, айва	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, листоверток, молей	0,5 л/10 л воды (Л)	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C. Расход рабочей жидкости – 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	-(1)	3(-)
Вишня, черешня, слива, алыча	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	0,5 л/10 л воды (Л)	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C. Расход рабочей жидкости – 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	-(1)	3(-)
Виноград	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок	0,5 л/10 л воды (Л)	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C. Расход рабочей жидкости – 0,5-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста)	-(1)	3(-)
Смородина	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листоверток	0,5 л/10 л воды (Л)	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C. Расход рабочей жидкости – 0,5-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста)	-(1)	3(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект(назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Крыжовник	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листоверток	0,5 л/10 л воды (л)	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C. Расход рабочей жидкости – 0,5-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста)	-(1)	3(-)
Декоративные кустарники	Зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, тлей, листоверток	0,5 л/10 л воды (л)	Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4°C. Расход рабочей жидкости – 0,5-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста)	-(1)	3(-)

Альтернативы

Профилактин Лайт, ВЭ Препарат 30 Плюс, ММЭ Профилактин, МКЭ МатринБио, ВР МатринБио БАУ, ВР

