

Димилин, СП

Наименование	Димилин, СП	Группа	Инсектициды и акарициды
Препаративная форма	смачивающийся порошок	Действующее вещество	Дифлубензурон
Содержание действующего вещества	250 г/кг	Регистратор	Ариста ЛайфСайенс Регистрейшнс Грейт Британ Лтд
Класс опасности	3/2	Срок окончания регистрации	29.10.2028
Номер государственной регистрации	379-01-2033-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Яблоня	Яблонная плодовая жук	1,0-2,0	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га	30(2)	7(3)
Яблоня	Минирующие моли	0,5	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га	30(2)	7(3)
Яблоня	Кольчатый шелкопряд, златогузка, боярышница	0,2	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га	30(2)	7(3)
Неплодоносящие сады, лесозащитные полосы	Американская белая бабочка	0,1-0,2	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га	-(2)	7(3)
Шампиньоны (защищенный грунт)	Грибные мухи и комарики	0,003 кг/м3	Опрыскивание субстрата. Срок безопасного выхода в камеры для выращивания шампиньонов – 2 дня. Расход рабочей жидкости – 0,25 л/м2	25(2)	7(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пастбища, дикая растительность	Саранчовые	0,14	Опрыскивание в период развития личинок. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод (дикая растительность) – 30 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	-(1)	7(3)
Пастбища, дикая растительность	Саранчовые	0,14 (А)	Опрыскивание в период развития личинок. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод (дикая растительность) – 30 дней. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га	-(1)	7(7)
Лиственные и хвойные породы	Листогрызущие и хвоегрызущие вредители	0,04-0,08 (А)	Опрыскивание в период вегетации. Срок безопасного выхода людей для сбора дикорастущих грибов и ягод (дикая растительность) – 30 дней. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га	-(1)	7(7)

Аналоги

Герольд, ВСК Димилин, ВДГ Дифлуцид, СП Шансилин, ВДГ Новинс, КС

Альтернативы

Твинго Евро, МД Локустин, КС Твинго, КС Скарабей, СЭ

