

Дифлуцид, СП

Наименование	Дифлуцид, СП	Группа	Инсектициды и акарициды
Препаративная форма	смачивающийся порошок	Действующее вещество	Дифлубензурон
Содержание действующего вещества	250 г/кг	Регистратор	ООО "Агропрогресс Кэмикалс"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	25.04.2029
Номер государственной регистрации	389-01-2210-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Яблоня	Яблонная плодовая жорка	1,0-2,0	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га.	40(2)	-(3)
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	0,14	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	0,05 (0,14 - в барьере) 0,14 (А)	Опрыскивание в период развития личинок барьерным (ленточным) способом по ширине барьера - 80-120 м и межбарьерного пространства 300 м. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	-(1)	-(3)
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	0,05 (0,14 - в барьере) 0,14 (А)	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости - 25-50 л/га	-(1)	-(3)
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	0,05 (0,14- в барьере) (А)	Опрыскивание в период развития личинок барьерным (ленточным) способом при ширине барьера 80-120 м и межбарьерного пространства 300 м. Расход рабочей жидкости -25-50 л/га	-(1)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Лиственные и хвойные породы	Листогрызущие и хвоегрызущие насекомые	0,04-0,1 (А)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 3-25 л/га	-(1)	-(3)
Лиственные и хвойные породы	Листогрызущие и хвоегрызущие насекомые, личинки и гусеницы младших возрастов	0,04-0,1	Опрыскивание в период питания личинок или гусениц. Расход рабочей жидкости -100- 200 л/га	-(1)	-(3)

Аналоги

Герольд, ВСК Димилин, ВДГ Димилин, СП Шансилин, ВДГ Новинс, КС

Альтернативы

Твинго Евро, МД Локустин, КС Твинго, КС Скарабей, СЭ

