## Алтын, КЭ

Наименование Алтын, КЭ
Препаративная форма концентрат эмульсии
Содержание действующего вещества
Класс опасности 3/1
Номер государственной регистрации 130-01-3344-1

Группа Инсектициды и акарициды

Действующее вещество Лямбда-цигалотрин

Регистратор ООО "РЕЗЕРВ"

Срок окончания регистрации 24.10.2031

## Назначение

| Культура<br>(обрабатываемый<br>объект)                                | Вредный объект<br>(назначение)                                                           | Норма<br>применения<br>препарата | Способ и время обработки                                                                                                                                                                                                                                  | Срок ожидания<br>(кратность<br>обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Пшеница яровая, озимая                                                | Клоп вредная<br>черепашка, тли,<br>цикадки, пьявица,<br>пшеничный трипс,<br>хлебные жуки | 0,15                             | Опрыскивание в период вегетации. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га                                                                                                                                                       | 28(1)                                     | -(4)                                             |
| Подсолнечник                                                          | Луговой мотылек,<br>долгоносики                                                          | 0,1-0,2                          | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га                                                                                                                                                                                   | 27(1)                                     | -(4)                                             |
| Картофель                                                             | Колорадский жук                                                                          | 0,1                              | Опрыскивание в п <mark>ер</mark> иод вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га                                                                                                                                                                    | 12(2)                                     | -(4)                                             |
| Лен-масличный, лен-<br>долгунец                                       | Блошки                                                                                   | 0,1-0,15                         | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га                                                                                                                                                                                   | 40(2)                                     | -(4)                                             |
| Пастбища, участки,<br>заселенные саранчовыми,<br>дикая растительность | Саранчовые<br>нестадные, саранчовые<br>стадные (личинки<br>младших возрастов)            | 0,1-0,15                         | Опрыскивание в период развития личинок. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территория – 30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(1)                                      | -(4)                                             |
|                                                                       |                                                                                          |                                  | -m-                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>                                  |                                                  |

| Культура<br>(обрабатываемый<br>объект)                                | Вредный объект<br>(назначение)                       | Норма<br>применения<br>препарата | Способ и время обработки                                                                                                                                                                                                                                  | Срок ожидания<br>(кратность<br>обработок) | Сроки выхода дляручных (механизированных) работ |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Пастбища, участки,<br>заселенные саранчовыми,<br>дикая растительность | Саранчовые стадные<br>(личинки старших<br>возрастов) | 0,2-0,4                          | Опрыскивание в период развития личинок. Срок для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территория – 30 дней. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 7 дней после обработки. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(1)                                      | -(4)                                            |

## Аналоги

Бретер, КЭ Карачар, КЭ Кунгфу, КЭ Лассо, КЭ Лямбда-С, КЭ Самум, КЭ Сенсей, КЭ Спарвиэро, МКС Молния, КЭ Оперкот, КЭ Гладиатор, КЭ Брейк, МЭ Каратошанс, КЭ Лямдекс, КЭ Кайзо, ВГ Гедеон, КЭ Дипломат, КЭ Гранулам, ВДГ Каратэ Зеон, МКС Торег, КЭ Цепеллин Эдванс, КЭ

## Альтернативы

Канонир Дуо, КС Имидашанс Плюс, СК Оперкот Акро, КС Борей, СК Клотиамет Дуо, КС Гладиатор Супер, КС Восторг, КС Органза, КС Декстер, КС Молния Дуо, КС Готика, КС Куррито, КС Солам, КС Амплиго, МКС Кунгфу Супер, КС Мелория, КС Эфория, КС Эфория, КС Эфория, КС Органза, КС Фактория, МКС Эфория Топ, МКС Промэкс, КЭ Кастра, КС