

Фуфанон-Нова, ВЭ

Наименование **Фуфанон-Нова, ВЭ**
Препаративная форма **водная эмульсия**
Содержание действующего вещества **440 г/л**
Класс опасности **3/1**
Номер государственной регистрации **012-02-135-1**

Группа **Инсектициды и акарициды**
Действующее вещество **Малатион**
Регистратор **ООО "Фирма "Зеленая Аптека Садовода"**
Срок окончания регистрации **18.09.2023**

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Яблоня, груша, айва	Яблонный цветоед, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки, клещи	13 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	20(2)	2(-)
Вишня, черешня, слива	Тли, долгоносики, плодожорки, пилильщики, вишневая муха, шелкопряды, моли, листоеды, пяденицы, щитовки	11,5 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	20(2)	2(-)
Смородина, крыжовник	Тли, моли, галлицы, листовертки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки, огнёвки, пяденицы	13 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-1,5 л/куст	20(2)	2(-)
Земляника	Малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи	11,5 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости - до 1,5/10 м2	20(2)	2(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Виноград	Клещи, мучнистый червец	13 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и типа формировки куста)	20(2)	2(-)
Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, мухи, тли, трипсы, белокрылка	13 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 1/10 м2	20(2)	2(-)
Огурец и томат открытого грунта	Клещи, ростковая муха, тли, трипсы	13 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 1/10 м2	20(2)	2(-)
Цветочные культуры, декоративные кустарники	Комплекс вредителей	13 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости - до 1,5/10 м2	-(2)	2(-)

Аналоги

Алиот, КЭ Искра М, КЭ Карбофот, КЭ Фуфанон, КЭ Антиклещ, КЭ Фуфанон Эксперт, ВЭ

Альтернативы

Профилактин, МКЭ Алатар, КЭ Инта-Ц-М, ТАБ Карбоцин, ТАБ

