

## Инта-Вир, ТАБ

Наименование	<b>Инта-Вир, ТАБ</b>	Группа	<b>Инсектициды и акарициды</b>
Препаративная форма	<b>таблетки</b>	Действующее вещество	<b>Циперметрин</b>
Содержание действующего вещества	<b>37,5 г/л</b>	Регистратор	<b>ООО "ФАСКО+"</b>
Класс опасности	<b>3/1</b>	Срок окончания регистрации	<b>20.05.2034</b>
Номер государственной регистрации	<b>149-01-4581-1</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Огурец и томат защищенного грунта	Тли	1 таб./10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 10 л/50 м2	3(1)	3(-)
Огурец и томат защищенного грунта	Белокрылка	2 таб./10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 10 л/50 м2	3(1)	3(-)
Картофель	Колорадский жук	1 таб./10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 10 л/100 м2	70(2)	3(-)
Яблоня, груша, айва	Плодожорки	1 таб./10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 2 л/молодое дерево, до 5 л /взрослое дерево	7(1)	3(-)
Смородина черная	Смородинная стеклянница, тли	1 таб./10 л воды (Л)	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости – до 2 л/10 кустов	17(2)	3(-)

### Аналоги

Альфафин, КЭ    Кинмикс, КЭ    Ньюстар, КЭ    Таран, ВЭ    Фьюри, ВЭ    Патрий, КЭ    Циперус, КЭ    Ципи, КЭ    Циракс, КЭ    Шарпей, МЭ    Арриво, КЭ    Молния  
Экстра, КЭ    Цитокс, КЭ



## Альтернативы

Эсперо Евро, МД Беретта, МД Кинфос Нео, КЭ Кинфос, КЭ Тибор, КЭ Эсперо, КС Имидж Плюс, КЭ Бифас, КС Клонрин, КЭ Алатар, КЭ Питомец, КС Бомбер, ДШ Шаман, КЭ Нурбел, КЭ Ранголи-Норил, КЭ Суперкилл, КЭ Нуримет Экстра, КЭ Ципи Плюс, КЭ Циклон, КЭ Инта-Ц-М, ТАБ Карбоцин, ТАБ Искра, ТАБ Бомбер, ДШ Раймир, КЭ Тиальф, КС Сектор, КЭ

