

## Искра, ТАБ

Наименование **Искра, ТАБ**  
Препаративная форма **таблетки**  
Содержание действующего вещества **21 + 9 г/кг**  
Класс опасности **3/1**  
Номер государственной регистрации **046-01-2708-1**

Группа **Инсектициды и акарициды**  
Действующее вещество **Циперметрин + перметрин**  
Регистратор **АО "ТПК Техноэкспорт"**  
Срок окончания регистрации **18.06.2030**

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Картофель	Колорадский жук	1 таб./10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-4 л/100 м2	20(2)	-(3)
Огурец и томат открытого грунта	Тли	1 таб./10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 10-20 л/100 м2	20(1)	-(3)
Яблоня	Тли	1 таб./10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево	20(1)	-(3)
Смородина (черная, красная)	Тли	1 таб./10 л воды (Л)	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости – 1,5 л/10 м2	60(2)	-(3)
Цветочные культуры, декоративные кустарники	Тли, трипсы	1 таб./10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-2 л/10 м2	-(2)	-(3)

### Аналоги



Эсперо Евро, МД Кинфос Нео, КЭ Кинфос, КЭ Тибор, КЭ Эсперо, КС Имидж Плюс, КЭ Бифас, КС Клонрин, КЭ Алатар, КЭ Питомец, КС Бомбер, ДШ Шаман, КЭ Нурбел, КЭ Ранголи-Норил, КЭ Суперкилл, КЭ Нуримет Экстра, КЭ Ципи Плюс, КЭ Циклон, КЭ Инта-Ц-М, ТАБ Карбоцин, ТАБ Бомбер, ДШ Раймир, КЭ Тиальф, КС Сектор, КЭ

#### Альтернативы

Альфацин, КЭ Кинмикс, КЭ Беретта, МД Ньюстар, КЭ Таран, ВЭ Фьюри, ВЭ Инта-Вир, ТАБ Патрий, КЭ Циперус, КЭ Ципи, КЭ Циракс, КЭ Шарпей, МЭ Арриво, КЭ Молния Экстра, КЭ Цитокс, КЭ

