

## Раттидион, Г

Наименование **Раттидион, Г**  
Препаративная форма **гранулы**  
Содержание действующего вещества **0,05 г/кг**  
Класс опасности **2/-**  
Номер государственной регистрации **141-06-3560-1**

Группа **Родентициды**  
Действующее вещество **Бромадиолон**  
Регистратор **ООО "ВАЛБРЕНТА КЕМИКАЛС"**  
Срок окончания регистрации **21.03.2032**

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в защищенном грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники,	Полевка обыкновенная, полевка восточноевропейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	5 г в нору или иную укрытую точку раскладки, 2 кг/га	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В после	-(1)	- (-)
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в защищенном грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники,	Полевка водяная, крыса серая	10 г в нору, 2 кг/га	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В после	-(1)	- (-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в защищенном грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники,	Против всех видов целевых грызунов	от 5 г до 40 г в приманочный ящик или трубку	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В после	-(1)	- (-)
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в защищенном грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники,	Полевка обыкновенная, полевка восточноевропейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	5 г в нору или иную укрытую точку раскладки, 0,2 кг/100 м2 (Л)	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В после	-(1)	- (-)
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в защищенном грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники,	Полевка водяная, крыса серая	10 г в нору, 0,2 кг/100 м2 (Л)	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В после	-(1)	- (-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые прочие, в т.ч. гречиха; прочие полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в защищенном грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники,	Против всех видов целевых грызунов	От 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку (Л)	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок без смены препарата. В после	-(1)	- (-)

Аналоги

Норат, Г Бром-БД, Концентрат

