

## Алирин-Б, ТАБ

|                                   |   |                            |   |
|-----------------------------------|---|----------------------------|---|
| Наименование                      | <b>Алирин-Б, ТАБ</b>                      | Группа                     | <b>Фунгициды</b>                          |
| Препаративная форма               | <b>таблетки</b>                           | Действующее вещество       | <b>Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР</b> |
| Содержание действующего вещества  | <b>титр не менее 10<sup>9</sup> КОЕ/г</b> | Регистратор                | <b>ООО УК "АБТ-ГРУПП",</b>                |
| Класс опасности                   | <b>4/3</b>                                | Срок окончания регистрации | <b>14.08.2029</b>                         |
| Номер государственной регистрации | <b>139-02-2348-1</b>                      |                            |   |

### Назначение

| Культура<br>(обрабатываемый<br>объект) | Вредный объект<br>(назначение)                        | Норма<br>применения<br>препарата | Способ и время обработки  | Срок ожидания<br>(кратность<br>обработок) | Сроки выхода для ручных<br>(механизированных) работ |
|--|---|----------------------------------|---|---|---|
| Рассада цветочных культур              | Черная ножка, корневая гниль, трахеомикозное увядание | 10-25 таб./10 м2                 | Полив грунта суспензией препарата перед посевом семян и пикировкой рассады, расход рабочей жидкости - 50 л/10 м2  | -(2)                                      | -(-)  |
| Томат защищенного грунта               | Корневая и прикорневая гниль, фитофтороз              | 1-2 таб./10 л (Л)                | Полив грунта за 1-3 суток перед посевом семян, перед высадкой рассады и в рассадный период с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м2 | -(3)                                      | -(-)  |
| Томат защищенного грунта               | Корневая и прикорневая гниль, фитофтороз              | 10-20 таб./15 л (Л)              | Опрыскивание растений в фазы начало цветения – плодообразование с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 10-15 л/100 м2                        | -(3)                                      | 1(1)  |
| Огурец защищенного грунта              | Корневая и прикорневая гниль                          | 1-2 таб./10 л (Л)                | Полив грунта за 1-3 суток до посева семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м2   | -(1)                                      | -(-)  |
| Огурец защищенного грунта              | Мучнистая роса  | 5-10 таб./15 л (Л)               | Опрыскивание растений в фазы начало цветения – плодообразование с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 15л/100 м2                            | -(3)                                      | 1(1)  |

| <b>Культура<br/>(обрабатываемый<br/>объект)</b> | <b>Вредный объект<br/>(назначение)</b>                       | <b>Норма<br/>применения<br/>препарата</b> | <b>Способ и время обработки</b>   | <b>Срок ожидания<br/>(кратность<br/>обработок)</b> | <b>Сроки выхода для ручных<br/>(механизированных) работ</b> |
|---|--|---|---|--|---|
| Томат открытого<br>грунта                       | Корневая и прикорневая<br>гниль, фитофтороз,<br>альтернариоз | 1-2 таб./10 л (Л)                         | Полив грунта за 1-3 суток до посева семян, перед<br>высадкой рассады, затем через 7-10 дней. Расход<br>рабочей жидкости - 10л/10 м2                                       | -(3)   | -(-)  |
| Томат открытого<br>грунта                       | Корневая и прикорневая<br>гниль, фитофтороз,<br>альтернариоз | 5-10 таб./10 л<br>(Л)                     | Опрыскивание растений в фазы начала<br>бутонизации, начала цветения, плодообразование<br>с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей<br>жидкости - 10 л/100 м2                | -(3)   | 1(1)  |
| Огурец открытого<br>грунта                      | Корневая и прикорневая<br>гниль                              | 1-2 таб./10 л (Л)                         | Полив грунта за 1-3 суток перед посевом семян.<br>Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м2  | -(1)   | -(-)  |
| Огурец открытого<br>грунта                      | Мучнистая роса   | 5-10 таб./10 л<br>(Л)                     | Опрыскивание растений суспензией препарата в<br>фазах начало цветения – плодобра-зование с<br>интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости -<br>10 л/100 м2              | -(3)   | 1(1)  |
| Земляника садовая                               | Серая гниль  | 5-10 таб./10 л<br>(Л)                     | Опрыскивание вегетирующих растений в фазы<br>бутонизации, после цветения и в начале<br>формирования ягод с интервалом 7-10 дней.<br>Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | -(3)   | 1(1)  |
| Рассада цветочных<br>культур                    | Черная ножка, корневая<br>гниль, трахеомикозное<br>увядание  | 1 таб./5 л (Л)                            | Полив грунта суспензией препарата перед<br>посевом семян и пикировкой рассады с<br>интервалом 15-20 дней. Расход рабочей жидкости<br>- 5 л/м2                             | -(2)   | -(-)  |
| Комнатные цветочные<br>растения                 | Корневая гниль,<br>трахеомикозное<br>увядание                | 1 таб./1 л (Л)                            | Полив грунта в горшках с интервалом 7-14 дней.<br>Расход рабочей жидкости - 0,1-1 л/1 горшок  | -(3)   | -(-)  |
| Комнатные цветочные<br>растения                 | Мучнистая роса   | 2 таб./1 л (Л)                            | Опрыскивание в период вегетации с интервалом<br>14 дней. Расход рабочей жидкости - 0,1-0,2 л/1 м2   | -(3)   | 1(1)  |



| Культура<br>(обрабатываемый<br>объект) | Вредный объект<br>(назначение)                | Норма<br>применения<br>препарата | Способ и время обработки  | Срок ожидания<br>(кратность<br>обработок) | Сроки выхода для ручных<br>(механизированных) работ |
|--|---|----------------------------------|---|---|---|
| Цветочные растения<br>открытого грунта | Корневая гниль,<br>трахеомикозное<br>увядание | 1 таб./5 л (Л)                   | Полив грунта под корень в период вегетации с<br>интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 5<br>л/1 м <sup>2</sup> | -(3)                                      | -(-)  |
| Цветочные растения<br>открытого грунта | Мучнистая роса                                | 2 таб./1 л (Л)                   | Опрыскивание в период вегетации с интервалом<br>15 дней. Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м <sup>2</sup>              | -(3)                                      | 1(1)  |

Аналоги

Алирин-Б, СП   Алирин-Б, Ж   Микозар, СП

