


## Бисолбицид, Ж

Наименование	<b>Бисолбицид, Ж</b>	Группа	<b>Фунгициды</b>
Препаративная форма	<b>жидкость</b>	Действующее вещество	<b>Bacillus subtilis, штамм BL01</b>
Содержание действующего вещества	<b>титр не менее 10<sup>8</sup> КОЕ/мл</b>	Регистратор	<b>ООО "Бисолби-Интер"</b>
Класс опасности	<b>ЗВ/З</b>	Срок окончания регистрации	<b>15.05.2028</b>
Номер государственной регистрации	<b>174-02-1916-1</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	2 мл/кг	Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов с последующим просушиванием в тени. Расход рабочей жидкости – 1-1,5 л/кг	-(1)	-(1)
Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	1 л/га	Полив рассады под корень 0,1 %-й рабочей жидкостью перед высадкой в грунт. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	-(1)	1(1)
Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	2-3 л/га	Опрыскивание растений в период вегетации: первое через 10 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие – с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	-(3)	1(1)
Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	2 мл/л воды (Л)	Опрыскивание растений в период вегетации 0,4%-м рабочим раствором с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 100-150 мл/100 г семян	-(1)	1(-)
Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	10 мл/10 л воды (Л)	Полив рассады под корень 0,1%-й рабочей жидкостью перед высадкой в грунт. Расход рабочей жидкости – 50-100 мл/растение	-(1)	1(-)





Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Томат открытого грунта	Фитофтороз, черная бактериальная пятнистость	2-3 мл/4 л воды (Л)	Опрыскивание растений в период вегетации: первое через 10 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие – с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 4 л/100 м <sup>2</sup>	-(3)	1(-)

Аналоги  
Бисолбицид, Ж

