

Гамаир, КС

Наименование **Гамаир, КС**
Препаративная форма **концентрат суспензии**
Содержание действующего вещества **титр 10¹⁰ КОЕ/мл**
Класс опасности **4/3**
Номер государственной регистрации **139-02-3967-1**

Группа **Фунгициды**
Действующее вещество **Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР**
Регистратор **ООО УК "АБТ-ГРУПП"**
Срок окончания регистрации **24.01.2033**

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Томат защищенного грунта	Фитофтороз, серая гниль, белая гниль, некроз сердцевины стебля, бактериальный рак	5-10	Полив грунта перед посевом семян, перед высадкой рассады в грунт, полив под корень в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3000 л/га	-(6)	-(-)
Томат защищенного грунта	Фитофтороз, серая гниль, белая гниль, некроз сердцевины стебля, бактериальный рак	5-10	Опрыскивание растений. Расход рабочей жидкости – 500- 2000 л/га	-(6)	1(-)
Огурец защищенного грунта	Корневая и прикорневая гниль фузариознопитиозной этиологии, трахеомикозное увядание фузариозновертициллезной этиологии, переноспороз, мучнистая роса	5-10	Полив грунта перед посевом семян, перед высадкой рассады в грунт, полив под корень в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 3000 л/га	-(6)	-(-)

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Огурец защищенного грунта	Корневая и прикорневая гниль фузариознопитиозной этиологии, трахеомикозное увядание фузариозновертициллезной этиологии, переноспороз, мучнистая роса	5-10	Опрыскивание растений. Расход рабочей жидкости – 500 - 2000 л/га	-(6)	1(-)

Аналоги

Гамаир, КС Гамаир, СП Гамаир, ТАБ Микозар, СП

