

Беномил 500, СП

Наименование **Беномил 500, СП**
Препаративная форма **смачивающийся порошок**
Содержание действующего вещества **500 г/кг**
Класс опасности **2/3**
Номер государственной регистрации **018-02-3295-1**

Группа **Фунгициды**
Действующее вещество **Беномил**
Регистратор **ООО "АГРУСХИМ"**
Срок окончания регистрации **19.11.2029**

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень, церкоспореллёзная гниль корневой шейки, фузариозная корневая гниль, офиоболёзная корневая гниль	0,3-0,6	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	50(1)	4(10)
Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса	0,5-0,6	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	50(1)	4(10)
Рожь озимая	Фузариозная снежная плесень, церкоспореллёзная гниль корневой шейки, фузариозная корневая гниль, офиоболёзная корневая гниль	0,3-0,6	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	50(1)	4(10)
Свекла сахарная (для промышленной переработки)	Мучнистая роса, церкоспороз	0,6-0,8	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400 л/га	20-40 (1-3)	4(10)
Пшеница яровая	Пыльная головня, твердая головня, фузариозная корневая гниль	2,0-3,0	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	4(10)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница озимая	Пыльная головня, твердая головня, церкоспореллезная гниль корневой шейки, фузариозная корневая гниль, фузариозная снежная плесень	2,0-3,0	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	4(10)
Ячмень яровой	Пыльная головня, каменная головня, фузариозная корневая гниль	2,0-3,0	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	4(10)
Ячмень озимый	Пыльная головня, каменная головня, ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль	2,0-3,0	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	4(10)
Овёс	Пыльная головня, покрытая головня, фузариозная корневая гниль	2,0-3,0	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	4(10)
Рожь озимая	Фузариозная снежная плесень, фузариозная корневая гниль, стеблевая головня	2,0-3,0	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	4(10)

Аналоги

Беназол, СП Бенорад, СП Фундазол, СП Нор-Би, СП

