

Витавакс 200ФФ, ВСК

Наименование	Витавакс 200ФФ, ВСК	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	водно-суспензионный концентрат	Действующее вещество	Карбоксин + тирам
Содержание действующего вещества	200 + 200 г/л	Регистратор	Ариста ЛайфСайенс Грейт Британ Лтд.
Класс опасности	3/-	Срок окончания регистрации	26.01.2024

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая, пшеница озимая	Твердая головня, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян	2,5-3	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Пшеница яровая, пшеница озимая	Пыльная головня	3	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Ячмень яровой, ячмень озимый	Каменная головня, гельминтоспориозные и фузариозные корневые гнили, плесневение семян	2,5-3	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Ячмень яровой, ячмень озимый	Пыльная головня, ложная пыльная головня	3	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Рожь озимая	Фузариозная корневая гниль, стеблевая головня, плесневение семян	2,5	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Кукуруза (кроме кукурузы на зеленый корм)	Пузырчатая головня, пыльная головня, плесневение семян	2,0-2,5	Протравливание семян перед посевом или заблаговре-менно. Расход рабочей жидкости - 5 л/т	-(1)	-(-)
Просо	Головня метелки	4	Протравливание семян перед посевом или заблаговре-менно. Расход рабочей жидкости - 10-15 л/т	-(1)	-(-)
Лен-долгунец	Антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, септориоз, церкоспороз, бактериоз	1,5-2	Протравливание семян перед посевом или заблаговре-менно. Расход рабочей жидкости - 5 л/т	-(1)	-(-)
Картофель семенной (кроме раннеспелых сортов)	Ризоктониоз	2	Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости - до 10 л/т	-(1)	-(-)

Аналоги

Витарос, ВСК Здоровая земля, ВСК Здоровый газон, ВСК

Альтернативы

Полирам ДФ, ВДГ Кабрио Топ, ВДГ ТМТД, ВСК ТМТД-плюс, КС ТМТД, ТПС Грануфло, ВДГ Митар, ВДГ Тирада, СК Виталон, КС Тир, ТПС
Гераклион, КС Тридим, КС Тирам, ВСК Полидок, ВДГ

