

Бордоская смесь Экстра, ВРП

Наименование	Бордоская смесь Экстра, ВРП	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	водорастворимый порошок	Действующее вещество	Меди сульфат + кальция гидроксид
Содержание действующего вещества	960 + 900 г/кг	Регистратор	АО "ТПК Техноэкспорт"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	29.11.2033
Номер государственной регистрации	149-02-304-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	100 г меди сульфата + 100 г кальция гидроксида / 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации 1%-ным рабочим раствором. Расход рабочей жидкости – 6 л/100 м2	25(4)	3(-)
Земляника	Септориоз	100 г меди сульфата + 100 г кальция гидроксида / 10 л воды	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости – 8 -10 л/100 м2	-(2)	3(-)
Малина	Септориоз	100 г меди сульфата + 100 г кальция гидроксида / 10 л воды	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Расход рабочей жидкости – 8 -10 л/100 м2	-(2)	3(-)
Роза открытого грунта	Ржавчина, пятнистости (черная, бурая, пурпурная), септориоз	100 г меди сульфата + 100 г кальция гидроксида / 10 л воды	Опрыскивание в период вегетации 1%-ным рабочим раствором. Расход рабочей жидкости – 10 - 15 л/100 м2	-(2)	3(-)
Виноград	Милдью	300 – 400 г меди сульфата + 400 г кальция гидроксида /10 л воды	Ранневесеннее "голубое" опрыскивание до распускания почек. Расход рабочей жидкости –10 - 15 л/100м2	-(1)	3(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Вишня	Коккомикоз, курчавость листьев, клястероспориоз, монилиоз	300 – 400 г меди сульфата + 400 г кальция гидроксида /10 л воды	Ранневесеннее "голубое" опрыскивание до распускания почек. Расход рабочей жидкости – 10 - 20 л/100 м2	-(1)	3(-)
Яблоня	Парша, бурая пятнистость, монилиоз	300 – 400 г меди сульфата + 400 г кальция гидроксида /10 л воды	Ранневесеннее "голубое" опрыскивание до распускания почек. Расход рабочей жидкости – 10 - 20 л/100 м2	-(1)	3(-)

Аналоги

Бордоская смесь-Ф, ВРП

Альтернативы

Бордоская жидкость, ВСК Индиго, КС Купроксат, КС Кумир, СК Чистосад, КС Мастеркоп, КС

