

Бордоская жидкость, ВСК

Наименование	Бордоская жидкость, ВСК	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	водно-суспензионный концентрат	Действующее вещество	Меди сульфат трехосновный
Содержание действующего вещества	172 г/л	Регистратор	АО Фирма "Август"
Класс опасности	3/2	Срок окончания регистрации	01.03.2033
Номер государственной регистрации	021-02-3994-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Яблоня, груша	Парша, монилиоз	250 мл/10 л воды (Л)	Ранневесеннее опрыскивание в фазе "зеленого конуса". Расход рабочей жидкости – от 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	60(1)	1(-)
Слива, вишня, черешня, абрикос, альча	Клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз	250 мл/10 л воды (Л)	Ранневесеннее опрыскивание в фазе "зеленого конуса". Расход рабочей жидкости – от 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	60(1)	1(-)
Слива	"Кармашки" слив	250 мл/10 л воды (Л)	Ранневесеннее опрыскивание в фазе "зеленого конуса". Расход рабочей жидкости – от 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	60(1)	1(-)
Смородина черная, крыжовник	Септориоз, антракноз, ржавчина столбчатая	250 мл/10 л воды (Л)	Ранневесеннее опрыскивание в фазе "зеленого конуса". Расход рабочей жидкости – 1-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	60(1)	1(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Яблоня, груша	Парша, монилиоз	100 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание по вегетации: первое после цветения; последующие - с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости – 2 - 5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	38(3)	1(-)
Слива, вишня, черешня, абрикос, алыча	Клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз	100 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание по вегетации: первое после цветения; последующие - с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости – 2 - 5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	28(3)	1(-)
Слива	"Кармашки" слив	100 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание по вегетации: первое после цветения; последующие - с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости – 2 - 5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны)	28(3)	1(-)
Смородина черная	Септориоз, антракноз, ржавчина столбчатая	100 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание по вегетации: первое - после цветения; последующие - с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости – 1-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	28(3)	1(-)
Крыжовник	Септориоз, антракноз, ржавчина столбчатая	100 мл/10 л воды (Л)	Опрыскивание по вегетации: первое - после цветения; последующие - с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости – 1-1,5 л/куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста)	20(3)	1(-)

Аналоги

Индиго, КС Купроксат, КС Кумир, СК Чистосад, КС

