

Индиго, КС

Наименование	Индиго, КС	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	концентрат суспензии	Действующее вещество	Меди сульфат трехосновный
Содержание действующего вещества	345 г/л	Регистратор	АО "Щелково Агрохим"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	30.06.2029
Номер государственной регистрации	018-02-2300-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Яблоня, груша	Парша, монилиоз	3,0-5,0	Опрыскивание в период вегетации – первое в фазу "зелёный конус", последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15 (4)	3(3)
Виноград	Серая гниль, чёрная пятнистость	4,0-6,0	Опрыскивание в период вегетации – первое при появлении первых признаков болезней; последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20 (4)	3(3)
Виноград	Милдью	4,0-6,0	Опрыскивание в период вегетации первое – профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20 (4)	3(3)
Персик, вишня, слива, черешня	Монилиоз, кластероспориоз, курчавость листьев	4,0-5,0	Опрыскивание в период вегетации – первое при появлении первых признаков болезней (до цветения); последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	7 (4)	3(3)
Яблоня, груша	Парша, монилиоз	30-50 мл/ 10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации – первое в фазу "зелёный конус", последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости- 10 л/100 м2 или 2-5 л/дерево	15 (4)	3(3)

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Виноград	Серая гниль, чёрная пятнистость	40-60 мл/ 10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации – при появлении первых признаков болезней; последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	20 (4)	3(3)
Виноград	Милдью	40-60 мл/ 10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации – первое профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	20 (4)	3(3)
Персик, вишня, слива, черешня	Монилиоз, кластероспориоз, курчавость листьев	40-50 мл/ 10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации – при появлении первых признаков болезней (до цветения); последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 или 2-5 л/дерево	7 (4)	3(3)

Аналоги

Бордоская жидкость, ВСК Купроксат, КС Кумир, СК Чистосад, КС

