

Пиктор Актив, КС

Наименование	Пиктор Актив, КС	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	концентрат суспензии	Действующее вещество	Пиракlostробин + боскалид
Содержание действующего вещества	250 + 150 г/кг	Регистратор	БАСФ СЕ
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	20.04.2031
Номер государственной регистрации	070-02-3399-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, серая гниль, белая гниль	0,6-0,8	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивания стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)
Подсолнечник	Альтернариоз, серая гниль, белая гниль, фузариозная корневая гниль, фомопсис, фомоз	0,8	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазе конец бутонизации - начало цветения. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)
Подсолнечник	Альтернариоз, склеротиниоз	0,6-0,8	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней: первое в фазе начало бутонизации, последующие с интервалов 10-14 дней. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га	60(2)	-(3)
Кукуруза	Пузырчатая головня, стеблевые гнили	0,8-1,0	Опрыскивание в период вегетации в фазу видимое образование междоузлий. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Соя	Аскохитоз, церкоспороз, антракноз	0,6-0,8	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	70(1)	-(3)
Горох	Аскохитоз, ржавчина	0,6-0,8	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	70(1)	-(3)
Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз, фомоз	0,6-0,8	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1)	-(3)

Аналоги

Беллис, ВДГ Сигнум, ВДГ

Альтернативы

Стандак Топ, КС Кантус, ВДГ Пиктор, КС Феразим Грин, КС Коллис, КС Крёз, КС Кабрио Топ, ВДГ Карамба Дуо, КЭ Оптимо, КЭ Дэлит Про, КС Пирафикс, КЭ Приаксор, КЭ Абакус Ультра, СЭ Абакус Прайм, СЭ Оскар, КЭ Мистерия, МЭ Архитект, СЭ Протего Макс, МЭ Тридим, КС Иншур Перформ, КС Цериакс Плюс, КЭ Кристалл, КС Архитект, СЭ Поларис Кватро, СМЭ Поларис Кватро, СМЭ Эйс, ККР Синтрон, КЭ Балая, КЭ Хауберк, КМЭ Приаксор Макс, КЭ Протект Комби, СЭ Эвклид, СК

