

Танос, ВДГ

Наименование	Танос, ВДГ	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	водно-диспергируемые гранулы	Действующее вещество	Фамоксадон + цимоксанил
Содержание действующего вещества	250 + 250 г/кг	Регистратор	ООО "Дюпон Наука и Технологии"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	14.04.2024
Номер государственной регистрации	019-02-819-1 019-02-819-1/252		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	0,6	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения, рост ягод и клубней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га	15(4)	7(3)
Виноград	Милдью	0,4	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (до цветения), последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	30(3)	7(3)
Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	0,5-0,6	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га	14(4)	7(3)
Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз	0,6	Опрыскивание в период вегетации в фазы: 4-6 настоящих листьев (профилактическое) и бутонизации. Расход рабочей жидкости – 400 л/га	50(2)	7(3)
Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз	0,4	Опрыскивание в период вегетации в фазы: 4-6 настоящих листьев (профилактическое), бутонизации и начала цветения. Расход рабочей жидкости – 400 л/га	50(3)	7(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	0,5-0,6	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га	21(3)	7(3)
Виноград	Милдью	4 г/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2	30(3)	7(3)
Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	6 г/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2	14(4)	7(3)
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	6 г/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2	15(4)	7(3)
Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	12 г/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (до цветения), последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2	21(3)	7(3)

Аналоги

Тонус, ВДГ Фамокс, ВДГ Таношанс, ВДГ Улис, ВДГ Целитель, ВДГ Профит Голд, ВДГ Санитар, ВДГ

Альтернативы

Кариал Флекс, ВДГ Рапид Голд, СП Моксимэйт, СП Ордан МЦ, СП Фортуна Голд, ВДГ Наутиль, ВДГ Рапид Голд Плюс, СП Ордан, СП Зорвек
Энкантия, СЭ Курзат Р, СП Купролюкс, СП Бронэкс, СП Миксанил, КС Витена 450, ВДГ Копфорс Экстра, ВДГ Процессор, КС

