

## Адванс, ВДГ

Наименование	<b>Адванс, ВДГ</b>	Группа	<b>Фунгициды</b>
Препаративная форма	<b>водно-диспергируемые гранулы</b>	Действующее вещество	<b>Флутриафол</b>
Содержание действующего вещества	<b>800 г/кг</b>	Регистратор	<b>ООО ГК "ЗЕМЛЯКОФ"</b>
Класс опасности	<b>3/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>05.05.2026</b>
Номер государственной регистрации	<b>606-02-3743-1 (взамен ранее выданного свидетельства от 05.03.2020 № 2579)</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	0,15-0,2	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	50(2)	-(3)
Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	0,2	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	50(1)	-(3)
Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	0,08	Опрыскивание в период вегетации: при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующие в случае необходимости с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	28(1-2)	-(3)



#### Аналоги

Импакт, КС    Импакт 500, КС    Кэнсел, КС    Скальпель, КС    Триафол, КС    Флуплант, КС    Флутривит, КС    Альфа Феникс, КС    Флуафол, КС    Фитолекарь, КС  
Форис, КС    Компакт, КС    Флутриобел, КС    Минхати, КС

#### Альтернативы

Медея, МЭ    Винтаж, МЭ    Импакт Эксклюзив, КС    Капелла, МЭ    Импакт Супер, КС    Страйк Форте, КС    Террасил Форте, КС    Фараон Супер, КС    Сансэр  
Ультра, КС    Винцит, КС    Пионер, КС    Тиазол, КС    Форпост, КС    Флуцит, КС    Ансамбль, КС    Виннер, КС    Феникс Дуо, КС    Консул, КС    Новус-Ф, КС  
Грандсил Ультра, КС    Винцит Форте, КС    Балинт, КС    Протект Форте, ВСК

