

Куприкол, КОЛР

Наименование	Куприкол, КОЛР	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	коллоидный раствор	Действующее вещество	Хлорокись меди
Содержание действующего вещества	200 г/л	Регистратор	АО "Казанский научно-исследовательский технологический институт вычислительной техники"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	25.06.2028
Номер государственной регистрации	407-02-1316-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Яблоня	Парша (при умеренном развитии болезни)	5	Опрыскивание в период вегетации в фазы зеленый конус, розовый бутон, конец цветения с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости – 800- 1000 л/га	30(3)	-(3)
Виноград	Милдью	5	Опрыскивание в период вегетации в фенофазы: видимое образование соцветия, начало цветения, позднее цветение, ягода с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 1000- 1500 л/га	40(4)	-(3)
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	5	Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: вытягивание стеблей; смыкание рядков; бутонизация – начало цветения с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400 - 600 л/га	40(3)	-(3)

Аналоги

Абига-Пик, ВС

Альтернативы



