

## Дротик, ККР

Наименование	<b>Дротик, ККР</b>	Группа	<b>Гербициды</b>
Препаративная форма	<b>концентрат коллоидного раствора</b>	Действующее вещество	<b>2,4-Д (сложный 2-этилгексильный эфир)</b>
Содержание действующего вещества	<b>400 г/л</b>	Регистратор	<b>ЗАО "Щелково Агрохим"</b>
Класс опасности	<b>2/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>18.03.2034</b>
Номер государственной регистрации	<b>018-03-4466-1</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,5-0,65	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков при низкой степени засоренности. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние (в т.ч. виды бодяка и осота, латук татарский, молочай лозный) двудольные сорняки	0,65-0,9	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,5-0,7	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков при низкой степени засоренности. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь	Однолетние и многолетние (в т.ч. виды бодяка и осота, латук татарский, молочай лозный) двудольные сорняки	0,7-0,9	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Кукуруза	Однолетние и многолетние (в т.ч. виды бодяка и осота, латук татарский и др.) двудольные сорняки	0,75-1,2	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)

#### Аналоги

Эстерон 600, КЭ    2,4-Дактив, КЭ    Шанс 24, КЭ    Эндимион, КЭ    Эстет, КЭ

#### Альтернативы

Аврорекс, КЭ    Модерн, КЭ    Балерина Форте, СЭ    Ассюлюта Прайм, МК    Балерина Супер, СЭ    Прима, СЭ    Примадонна, СЭ    Пальмира, СЭ    Балерина, СЭ  
 Примадонна Супер, ККР    Пришанс, СЭ    Астэрикс, СЭ    Примавера, СЭ    Камаро, СЭ    Ламбада, СЭ    Флоробел, СЭ    Статус Фло, КЭ    Фортиссимо, МД  
 Прима КА, СЭ

