

Репер Трио, МД

Наименование	Репер Трио, МД	Группа	Гербициды
Препаративная форма	масляная дисперсия	Действующее вещество	Клопиралид (сложный 2-этилгексилловый эфир) + пиклорам + аминопиралид
Содержание действующего вещества	267 + 80 + 17 г/л	Регистратор	АО "Щелково Агрохим"
Класс опасности	2/3	Срок окончания регистрации	12.07.2031
Номер государственной регистрации	009-03-384-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Рапс яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота	0,2-0,3	Опрыскивание вегетирующих растений с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. При необходимости пересева в сезон применения препарата, на том же поле можно выращивать кукурузу, сорго, яровые зерновые и злаковые травы через 1 месяц	60 (1)	- (3)
Рапс озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота	0,2-0,3	Опрыскивание вегетирующих растений осенью или весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. При необходимости пересева после весеннего применения препарата, на том же поле можно выращивать кукурузу, сорго, яровые зерновые и	60 (1)	- (3)

Альтернативы



Прима Форте 195, СЭ Балерина Форте, СЭ Аминка Трио, СЭ Ланцелот 450, ВДГ Генсек, ВГР Дикамерон, ВР Галион, ВР Зенарил, ВР Круцифер, ВР
Меридиан, ВР Рапсан, ВР Кирай, ВР Лерашанс, ВР Шкипер, ВР Актеон, ВР Мегалит, ВР РапсАгро, ВР Галера Супер 364, ВР Фултайм, МД
Горгон, ВРК НордСтрим, ВДГ Этамастер Супер, ВДГ Клинч, ВДГ Фортиссимо, МД Аврора, МД Кригер, ВР Прима Форте КА, СЭ Галера Супер КА, ВР

