

## Орлан, МК

Наименование	<b>Орлан, МК</b>	Группа	<b>Гербициды</b>
Препаративная форма	<b>масляный концентрат</b>	Действующее вещество	<b>Метазахлор + квинмерак</b>
Содержание действующего вещества	<b>250 + 63 г/л</b>	Регистратор	<b>ООО "Агро Эксперт Групп"</b>
Класс опасности	<b>3/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>23.04.2030</b>
Номер государственной регистрации	<b>021-03-1701-1 (взамен ранее выданного свидетельства от 25.03.2015 № 607)</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Рапс яровой	Однолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий	2,0-3,0	Опрыскивание почвы до всходов культуры или в фазу от семядолей до 4-6 листьев культуры и ранние фазы развития сорняков (семядоли). Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	60(1)	-(3)
Рапс озимый	Однолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий	2,0-3,0	Опрыскивание почвы до всходов культуры весной в фазу 1-4 листьев культуры и ранние фазы развития сорняков (семядоли). Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	60(1)	-(3)
Рапс озимый	Однолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий	2,0-3,0	Опрыскивание почвы до всходов культуры осенью в фазу 1-4 листьев культуры и ранние фазы развития сорняков (семядоли). Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	-(1)	-(3)

### Аналоги

Бутизан Стар, КС    ТРАНШ Супер, СК

### Альтернативы



Нопасаран Ултра, КС   Ребелл Т, КС   Бутизан 400, КС   Султан, СК   Нопасаран, КС   Голтикс Титан, КС

