

Зино, СП

Наименование **Зино, СП**
Препаративная форма **смачивающийся порошок**
Содержание действующего вещества **700 г/кг**
Класс опасности **3/3**
Номер государственной регистрации **156-03-3806-1**

Группа **Гербициды**
Действующее вещество **Метрибузин**
Регистратор **ООО "Агрорус и Ко", Агрия АД**
Срок окончания регистрации **26.12.2031**

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Томат (рассадный)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	1,1-1,4	Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	7(3)
Томат (рассадный)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	1	Опрыскивание через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	7(3)
Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	0,7-1,4	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	7(3)
Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	0,5-1,0 + 0,3	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(2)	7(3)

Аналоги

Зонтран, ККР Ранголи-Гильотина, ВДГ Сойл Флюид, КС Метрифар 70, ВГ Мэр, КС Лазурит, СП Лазурит Супер, КНЭ Лазурит Т, СП Лазурит Ультра, СК Зенкор Ультра, КС Тирон, ВДГ Топкама, ВДГ

Альтернативы
Артист, ВДГ

