

Мэр, КС

Наименование	Мэр, КС	Группа	Гербициды
Препаративная форма	концентрат суспензии	Действующее вещество	Метрибузин
Содержание действующего вещества	480 г/л	Регистратор	ООО "ЛИСТЕРРА"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	21.07.2031
Номер государственной регистрации	322-03-1202-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	1,63-2,0	Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57 (1)	-(3)
Томат рассадный	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	1,5	Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	57 (1)	-(3)
Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	1,0	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200- 300 л/га	60 (1)	-(3)
Томат посевной	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	0,38+0,63	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60 (2)	-(3)
Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	1,0-2,0	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60 (1)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	1,0-1,13	Опрыскивание при высоте ботвы до 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60 (1)	-(3)
Картофель (кроме раннеспелого)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	0,75-1,5 + 0,44	Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости - 200-300	60 (2)	-(3)
Соя	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	0,75-1,25	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60 (1)	-(3)

Аналоги

Зино, СП Зонтран, ККР Ранголи-Гильотина, ВДГ Соил Флюид, КС Метрифар 70, ВГ Лазурит, СП Лазурит Супер, КНЭ Лазурит Т, СП Лазурит Ультра,
СК Зенкор Ультра, КС Тирон, ВДГ Топкама, ВДГ

Альтернативы

Артист, ВДГ

