

Властелин, ВК

Наименование	Властелин, ВК	Группа	Гербициды
Препаративная форма	водорастворимый концентрат	Действующее вещество	МЦПА кислоты (смесь диметиламинной, калиевой, натриевой солей)
Содержание действующего вещества	500 г/л	Регистратор	ООО "ЯРИЛО"
Класс опасности	2/3	Срок окончания регистрации	29.02.2032
Номер государственной регистрации	050(360)-03-3156-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	Однолетние двудольные сорные растения	1-1,5	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	57(1)	-(3)
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорные растения	0,7-1,5	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	57(1)	-(3)
Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения	0,5-0,8	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	50(1)	-(3)
Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта)	Однолетние двудольные сорные растения	1,2	Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Лен-долгунец	Однолетние двудольные сорные растения	0,8-1	Опрыскивание посевов в фазе "елочки" при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)	-(3)

Аналоги

Антарес, ВК Момус, ВРК Гербикс, ВК Царумин, ВК

