

Кассиус, ВРП

Наименование	Кассиус, ВРП	Группа	Гербициды
Препаративная форма	водорастворимый порошок	Действующее вещество	Римсульфурон
Содержание действующего вещества	250 г/кг	Регистратор	АО "Щелково Агрохим"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	07.10.2030
Номер государственной регистрации	192-03-1016-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	0,04	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	0,05	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорных растений (пырея) 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	0,03+0,02	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработ	60(2)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	0,05	Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы роста (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/	60(1)	-(3)
Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	0,03+0,02	Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорных растений и повторно по второй волне сорных растений, в ранние фазы роста (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900	60(2)	-(3)

Аналоги

Денди, СТС Гримс, ВДГ Префект, ВДГ Ранголи-Тиран, ВДГ Титус, СТС Римус, ВДГ Тример, ВДГ Ромул, ВДГ Маис, СТС Римэкс, ВДГ Римапол,
ВДГ Эскудо, ВДГ Шантус, ВДГ Алтис, ВДГ Арпад, ВДГ Цицерон, ВДГ Римлин, ВДГ Дандрис, ВДГ

Альтернативы

Титус Плюс, ВДГ Кордус Плюс, ВДГ Кордус, ВДГ Базис, СТС Тезис, ВДГ Аркан, ВДГ Слоузен, ВДГ Кордус Форте, ВДГ Базис Форте, ВДГ

