

## Кассиус, ВРП

Наименование	<b>Кассиус, ВРП</b>	Группа	<b>Гербициды</b>
Препаративная форма	<b>водорастворимый порошок</b>	Действующее вещество	<b>Римсульфурон</b>
Содержание действующего вещества	<b>250 г/кг</b>	Регистратор	<b>АО "Щелково Агрохим"</b>
Класс опасности	<b>3/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>07.10.2030</b>
Номер государственной регистрации	<b>192-03-1016-1</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	0,04	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	0,05	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорных растений (пырея) 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	0,03+0,02	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработ	60(2)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срокоожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	0,05	Опрыскивание нежелательной травянистой растительности при высоте до 35 см. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих ягод и грибов в сезон проведения обработки территорий не допускается. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	60(1)	-(3)
Картофель (кроме раннеспелых сортов)	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	0,03+0,02	Опрыскивание нежелательной травянистой растительности при высоте до 35 см. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих ягод и грибов в сезон проведения обработки территорий не допускается. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	60(2)	-(3)

#### Аналоги

Денди, СТС    Гримс, ВДГ    Префект, ВДГ    Ранголи-Тиран, ВДГ    Титус, СТС    Римус, ВДГ    Триммер, ВДГ    Ромул, ВДГ    Маис, СТС    Римэкс, ВДГ    Риманол,  
ВДГ    Эскудо, ВДГ    Шантус, ВДГ    Алтис, ВДГ    Арпад, ВДГ    Цицерон, ВДГ    Римлин, ВДГ    Дандрис, ВДГ

#### Альтернативы

Титус Плюс, ВДГ    Кордус Плюс, ВДГ    Кордус, ВДГ    Базис, СТС    Тезис, ВДГ    Аркан, ВДГ    Слоузен, ВДГ    Кордус Форте, ВДГ    Базис Форте, ВДГ

