

Маис, СТС

Наименование	Маис, СТС	Группа	Гербициды
Препаративная форма	сухая текучая суспензия	Действующее вещество	Римсульфурон
Содержание действующего вещества	250 г/кг	Регистратор	ООО "Агро Эксперт Групп"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	08.12.2030
Номер государственной регистрации	043(042, 002)-03-2663-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,04	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,05	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,03+0,02	Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период до начала или после окончания роста сосны и ели. Не применять в последний год выращивания культур или содержать площадь под черным паром в течение года после выкопки сосны и ели. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га	60(2)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Картофель (кроме ранних сортов)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,05	Опрыскивание посадок после окучевания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Картофель (кроме ранних сортов)	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,03+0,02	Опрыскивание посадок после окучевания по первой и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея ползучего 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Бит 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) при каждой обработке. Расход рабочей жидкости – 200-30	60(2)	-(3)

Аналоги
Денди, СТС Гримс, ВДГ Префект, ВДГ Кассиус, ВРП Ранголи-Тиран, ВДГ Титус, СТС Римус, ВДГ Тример, ВДГ Ромул, ВДГ Римэкс, ВДГ
Риманол, ВДГ Эскудо, ВДГ Шантус, ВДГ Алтис, ВДГ Арпад, ВДГ Цицерон, ВДГ Римлин, ВДГ Дандрис, ВДГ

Альтернативы
Титус Плюс, ВДГ Кордус Плюс, ВДГ Кордус, ВДГ Базис, СТС Тезис, ВДГ Аркан, ВДГ Слоузен, ВДГ Кордус Форте, ВДГ Базис Форте, ВДГ

