

Цицерон, ВДГ

Наименование	Цицерон, ВДГ	Группа	Гербициды
Препаративная форма	водно-диспергируемые гранулы	Действующее вещество	Римсульфурон
Содержание действующего вещества	250 г/кг	Регистратор	ООО "ИНТЕР ГРУПП"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	15.12.2026
Номер государственной регистрации	082-03-1308-1	Область	Сельскохозяйственное производство
Химический класс	Сульфонилмочевины	Метод проникновения	Системный пестицид
Характер действия	Гербицид избирательного действия	Производитель	ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат»
Форма выпуска	Банка 0,5 кг	Срок хранения	н.д.

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,04	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ ЛИП, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,05	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ ЛИП, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,03 + 0,02	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ ЛИП, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	60(2)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	0,05	Опрыскивание посадок после окучивания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ ЛИП, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	50(1)	-(3)
Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	0,03 + 0,02	Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ ЛИП, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	50(2)	-(3)

Аналоги

Денди, СТС Гримс, ВДГ Префект, ВДГ Кассиус, ВРП Ранголи-Тиран, ВДГ Титус, СТС Римус, ВДГ Тример, ВДГ Ромул, ВДГ Маис, СТС Римэкс, ВДГ Римапол, ВДГ Эскудо, ВДГ Шантус, ВДГ Алтис, ВДГ Арпад, ВДГ Римлин, ВДГ Дандрис, ВДГ

Альтернативы

Титус Плюс, ВДГ Кордус Плюс, ВДГ Кордус, ВДГ Базис, СТС Тезис, ВДГ Аркан, ВДГ Слоузен, ВДГ Кордус Форте, ВДГ Базис Форте, ВДГ

