

## Римлин, ВДГ

Наименование	<b>Римлин, ВДГ</b>	Группа	<b>Гербициды</b>
Препаративная форма	<b>водно-диспергируемые гранулы</b>	Действующее вещество	<b>Римсульфурон</b>
Содержание действующего вещества	<b>250 г/кг</b>	Регистратор	<b>ООО "СФ-РЕГИСТРЭЙШН"</b>
Класс опасности	<b>3/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>25.07.2027</b>
Номер государственной регистрации	<b>082-03-1308-1</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	0,04	Опрыскивание в посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	0,05	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения	0,03+0,02	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки). Расход рабоч	60(2)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	0,05	Опрыскивание посадок после окучивание, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	50(1)	-(3)
Картофель	Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	0,03+0,02	Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ 90, Ж(900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50(2)	-(3)

#### Аналоги

Денди, СТС    Гримс, ВДГ    Префект, ВДГ    Кассиус, ВРП    Ранголи-Тиран, ВДГ    Титус, СТС    Римус, ВДГ    Тример, ВДГ    Ромул, ВДГ    Маис, СТС    Римэкс, ВДГ    Римапол, ВДГ    Эскудо, ВДГ    Шантус, ВДГ    Алтис, ВДГ    Арпад, ВДГ    Цицерон, ВДГ    Дандрис, ВДГ

#### Альтернативы

Титус Плюс, ВДГ    Кордус Плюс, ВДГ    Кордус, ВДГ    Базис, СТС    Тезис, ВДГ    Аркан, ВДГ    Слоузен, ВДГ    Кордус Форте, ВДГ    Базис Форте, ВДГ

