

## Трибел, ВДГ

Наименование	<b>Трибел, ВДГ</b>	Группа	<b>Гербициды</b>
Препаративная форма	<b>водно-диспергируемые гранулы</b>	Действующее вещество	<b>Трибенурон-метил</b>
Содержание действующего вещества	<b>750 г/кг</b>	Регистратор	<b>ООО "БЕЛИН"</b>
Класс опасности	<b>3/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>11.11.2029</b>
Номер государственной регистрации	<b>535-03-3305-1</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	10-15 г/га	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых – весной с добавлением 200 мл ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	15-20 г/га	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой	20-25 г/га	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры с добавлением 200 мл ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и бодяка полевого – в фазе розетки. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и бодяк полевой	15-20 г/га	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры с добавлением 200 мл ПАВ Дар-90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и бодяка полевого – в фазе розетки. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)

#### Аналоги

Гренадер, ВДГ Бенрил, ВДГ Гекстар, ВДГ Террастар, ВДГ Артстар, ВДГ Грэнери, ВДГ Громстор, ВДГ Гранд Плюс, ВДГ Гюрза, СП Санфло, ВДГ  
Гран-при, ВДГ Норман, ВДГ Трибун, СТС Сталкер, ВДГ Суперстар, ВДГ Коррида, ВДГ Мортира, ВДГ Гранат, ВДГ Аргамак, ВДГ Герсотил, ВДГ  
Триммер, ВДГ Шанстар, ВДГ Прометей, ВДГ Старбокс, СТС Гранилин, ВДГ Спецназ 750, ВДГ Бен Гур, ВДГ АЛЬФА СТАР, ВДГ Химстар, ВДГ  
ТриАлт, ВДГ Трибинстар, ВДГ Трибунал, ВДГ Агростар, ВДГ Ранголи-Трибенурон, ВДГ Экспресс, ВДГ Ферат, ВДГ Тризлак, ВДГ Флюенс, ВДГ  
Таллер, ВДГ Триметил, ВДГ Саунар, ВДГ Спецназ, ВДГ

#### Альтернативы

Эллай Лайт, ВДГ Эллада, ВДГ НордСтрим, ВДГ Калибр, ВДГ Калибр Голд, ВДГ Калибр Дуо, ВДГ Калибр Дуо Голд, ВДГ Патрон, ВДГ Статус Макс,  
ВДГ Трисил, ВДГ Трибьют, ВГ Каскад Премиум, ВДГ Гранстар Мега, ВДГ Экспресс Голд, ВДГ Магnum Супер, ВДГ Плуггер, ВДГ Агростар Гранд, ВДГ  
Бомба, ВДГ Статус Гранд, ВДГ Тандем, ВДГ Шанстар Плюс, ВДГ Суперстар Голд, ВДГ Полиан, МД Статус Голд, ВДГ Кайен Турбо, МД

