

Кентавр, ВДГ

Наименование	Кентавр, ВДГ	Группа	Гербициды
Препаративная форма	водно-диспергируемые гранулы	Действующее вещество	Флукарбазон натрия
Содержание действующего вещества	700 г/кг	Регистратор	АО Фирма "Август"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	09.02.2032
Номер государственной регистрации	699-03-4319-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница озимая и яровая	Однолетние злаковые (овсюг, метлица обыкновенная, щетинник зеленый) и некоторые двудольные (щирица запрокинутая, горчица полевая, фаллопия (гречишка) вьюнковая, пастушья сумка обыкновенная, неслия метельчатая, самосев рапса) сорные растения	0,025	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листа у культуры. Соблюдать ограничения по севообороту. На следующий год можно высевать все культуры, кроме свеклы, (безопасный интервал между применением гербицида и посевов свеклы - 16 месяцев). Расход рабочей жидкости: при наземном применении – 200-300 л/га, при авиационном – 25-50 л/га	60(1)	-(3)
Пшеница озимая и яровая	Однолетние злаковые (овсюг, метлица обыкновенная, щетинник зеленый) и некоторые двудольные (щирица запрокинутая, горчица полевая, фаллопия (гречишка) вьюнковая, пастушья сумка обыкновенная, неслия метельчатая, самосев рапса) сорные растения	0,042-0,07	Опрыскивание посевов по вегетирующим растениям, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения культуры в ранние фазы роста двудольных сорных растений. Озимые обрабатываются весной. Соблюдать ограничения по севообороту: пшеницу твердых сортов можно высевать	60(1)	-(3)



Аналоги
Эверест, ВДГ

