

Гамаир, ТАБ

Наименование	Гамаир, ТАБ	Группа	Регуляторы роста растений
Препаративная форма	таблетки	Действующее вещество	Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР
Содержание действующего вещества	титр не менее 10⁹ КОЕ/г	Регистратор	ООО УК "АБТ-ГРУПП"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	14.08.2029
Номер государственной регистрации	139-02-2115-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Горшечные цветочные культуры защищенного грунта	Корневая гниль, трахеомикозное увядание	5 таб./10 м ²	Полив грунта в горшках с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 25 л/10 м ²	-(3)	-(-)
Горшечные цветочные культуры защищенного грунта	Антракноз, фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, плесневение семян	20 таб./100 м ²	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	-(3)	1(1)
Цветочные культуры открытого грунта	Корневая гниль, трахеомикозное увядание	10 таб./10 м ²	Полив почвы под корень в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 50 л/10 м ²	-(3)	-(-)
Цветочные культуры открытого грунта	Септориозная пятнистость	20 таб./100 м ²	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	-(3)	1(1)
Томат защищенного грунта	Бактериальный рак, фитофтороз, белая и серая гнили	1-2 таб./10 л (л)	Полив грунта за 1-3 суток до посева семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м ²	-(1)	-(-)

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Томат защищенного грунта	Бактериальный рак, фитофтороз, белая и серая гнили	5-10 таб./15 л (Л)	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 15 л/100 м ²	-(3)	1(1)
Огурец защищенного грунта	Корневая гниль, серая гниль	1-2 таб./10 л (Л)	Полив грунта за 1-3 суток до посева семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м ²	-(1)	-(-)
Огурец защищенного грунта	Корневая гниль, серая гниль	5-10 таб./15 л (Л)	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 15 л/100 м ² .	-(2)	1(1)
Томат открытого грунта	Корневая и прикорневая гниль, фитофтороз, альтернариоз	1-2 таб./10 л (Л)	Полив грунта за 1-3 суток до посева семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м ²	-(1)	-(-)
Томат открытого грунта	Корневая и прикорневая гниль, фитофтороз, альтернариоз	5-10 таб./10 л (Л)	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых симптомов одного из заболеваний, затем с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости -10 л/100 м ²	-(3)	1(1)
Огурец открытого грунта	Корневая гниль	1-2 таб./10 л (Л)	Полив грунта за 1-3 суток перед посевом семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м ²	-(1)	-(-)
Огурец открытого грунта	Пероноспороз	5-10 таб./10л (Л)	Опрыскивание растений в период вегетации при появлении первых симптомов заболевания, затем - с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	-(3)	1(1)
Капуста белокочанная	Черная ножка	1-2 таб./10л (Л)	Полив грунта за 1-3 суток до посева семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/10 м ²	-(1)	-(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Капуста белокочанная	Сосудистый и слизистый бактериоз	5-10 таб./10 л (Л)	Опрыскивание растений в фазу 4-5 настоящих листьев, затем с интервалом 15-20 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	-(3)	1(1)
Яблоня	Парша, монилиоз	5-10 таб. /10 л (Л)	Опрыскивание растений в период вегетации в фазах розовый бутон, после цветения, плод размером с лесной орех. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	-(3)	1(1)
Комнатные цветочные растения	Корневая гниль, трахеомикозное увядание	1 таб./1 л (Л)	Полив грунта в горшках с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 0,1- 1л/1 горшок	-(3)	-(-)
Комнатные цветочные растения	Антракноз, церкоспороз, ржавчина, склеротиниоз	2 таб./1 л (Л)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 0,1-0,2 л/1 м ²	-(3)	1(1)
Цветочные растения открытого грунта	Корневая гниль, трахеомикозное увядание	1 таб./5 л (Л)	Полив почвы под корень в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/1 м ²	-(3)	1(1)
Цветочные растения открытого грунта	Септориозная пятнистость	2 таб./1 л (Л)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 1 л/10 м ²	-(3)	-(-)

Аналоги

Гамаир, КС Гамаир, КС Гамаир, СП Микозар, СП

