

Пульмакс, ВРК

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| Наименование | Пульмакс, ВРК | Группа | Гербициды |
| Препаративная форма | водорастворимый концентрат | Действующее вещество | Имазомакс |
| Содержание действующего вещества | 120 г/л | Регистратор | АО "ТПК Техноэкспорт" |
| Класс опасности | 4/3 | Срок окончания регистрации | 22.05.2032 |
| Номер государственной регистрации | 607-03-3728-1 (взамен ранее выданного свидетельства от 05.03.2020 № 2567) | | |

Назначение

| Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|----------------------------------|--|----------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Горох (кроме овощного горошка) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,25 – 0,35 | Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, три | 52(1) | -(3) |
| Соя | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,25 – 0,35 | Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, три | 52(1) | -(3) |



| Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|---|---|----------------------------------|--|---|--|
| Рапс яровой на семена и масло (гибриды, устойчивые к имидазо- линонам) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | 0,3 – 0,4 | Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год – яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, три | 52(1) | -(3) |

Аналоги
Юзмар, ВР

